

Mentoplastia o Cirugía del Mentón

Esta ficha informativa tiene por objetivo ser un complemento a su primera consulta, e intenta responder a algunos de los interrogantes que usted se pueda formular con respecto al procedimiento quirúrgico de Mentoplastia con implante. El fin de este documento es recordarle todos los elementos informativos necesarios e indispensables que le permitan a usted tomar una decisión bien fundamentada.

Definición, objetivos y principios

El tercio inferior de la cara tiene un rol importante en la apariencia y armonía faciales. Las alteraciones del mentón pueden alterar el equilibrio entre el tercio inferior y el resto de la cara además de generar un impacto negativo en el atractivo facial global.

La Mentoplastia es una opción quirúrgica para el tratamiento de ciertas anomalías del mentón que permite restablecer la congruencia a la región inferior de la cara.

Antes de la intervención quirúrgica

Se realizará un interrogatorio y examen físico.

En función de las características anatómicas y deseos de la paciente y de la preferencia y experiencia del cirujano surgirá una táctica operatoria. Se decidirá lugar de emplazamiento de las incisiones.

Se realizará un laboratorio, ECG y Riesgo quirúrgico. No podrá ingerir ningún medicamento que contenga ASPIRINA dentro de los diez días previos a la intervención.

Tipo de anestesia y modalidades de internación

Tipo de anestesia: dos procedimientos son generalmente posibles

- Anestesia local y sedación por vía endovenosa.
- Anestesia general clásica, durante la cuál usted duerme completamente.

Modalidad de internación:

La intervención se puede practicar en forma ambulatoria, es decir con alta sanatorial el mismo día luego de algunas horas de recuperación.

La intervención quirúrgica

En cuánto a la Mentoplastia con implante podemos decir que existen dos vías de abordaje: la vestibular (intraoral) o la submentoniana (externa). En el abordaje vestibular se realiza una incisión en el interior de la cavidad oral, a nivel del surco labial, por dónde se introduce el implante.

En la vía de abordaje submentoniana se realiza la incisión en la piel justo a nivel del pliegue submentoniano.

Luego de introducido el implante y cerradas las incisiones, se realiza una curación especial con tela adhesiva elástica.

Luego de la intervención quirúrgica: cuidados postoperatorios

Por lo general, el postoperatorio no es doloroso. Eventualmente puede existir un cierto grado de malestar fácilmente controlable con analgésicos comunes. Los hilos utilizados para las suturas son reabsorbibles. Caso contrario, serán retirados en el consultorio luego de algunos días.

La interrupción de las actividades cotidianas es mínima.

Complicaciones posibles

Una Mentoplastia es una intervención quirúrgica y como tal, implica ciertos riesgos. Conviene distinguir aquellos asociados a la anestesia de aquellos asociados al acto quirúrgico:

Complicaciones inherentes al tipo de anestesia:

el médico anesestesiólogo informará el mismo a la paciente, sobre los riesgos de la anestesia. Es importante señalar que las técnicas de anestesia, los productos anestésicos y los métodos de monitoreo del paciente han hecho un inmenso progreso en los últimos veinte años, ofreciendo una seguridad óptima sobre todo cuando la intervención es realizada fuera del contexto de una emergencia y en individuos en buen estado de salud.

En lo que respecta al acto quirúrgico propiamente dicho, eligiendo un cirujano plástico calificado y competente, debidamente formado en este tipo de intervenciones, usted limita al máximo estos riesgos.

En la práctica diaria, la mayoría de las Mentoplastias transcurren sin problemas. El postoperatorio es relativamente simple y los pacientes se encuentran plenamente satisfechos con los resultados obtenidos. Sin embargo, a veces, las complicaciones pueden ocurrir.

Complicaciones inherentes al acto quirúrgico

- Hematoma: consiste en la acumulación de sangre. Aparece generalmente en las primeras horas del postoperatorio. Según la magnitud del mismo, puede requerir su evacuación en quirófano.
- Seroma: consiste en la acumulación de líquido linfático alrededor del implante. Generalmente son mínimos y resuelven en forma espontánea.

DR. LUIS A. PEZZUTTI
CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA

- Infección: puede no ser resuelta con tratamiento antibiótico únicamente y requerir drenaje quirúrgico y extracción del implante .
- Cicatrices inestéticas: en el proceso de cicatrización entran en juego fenómenos bastante aleatorios. Puede ser que, en algunas ocasiones, la cicatriz resultante no sea del todo estética.
- Alteración de la sensibilidad: se puede observar en los primeros meses del postoperatorio. En la mayoría de los casos revierte espontáneamente y en forma completa.
- Desplazamiento del implante: requiere la extracción del mismo.
- Erosión ósea: hecho frecuente a nivel dónde apoya el implante.

Esta es la información que podemos acercarle hoy en día, desde el punto de vista científico y legal, en el campo de la Mentoplastia con implante.

La idea no es sobrevalorar los riesgos, sino simplemente tomar conciencia que en una intervención quirúrgica, aún aparentemente simple, siempre los hay.

El recurrir a un cirujano plástico calificado le asegura a usted que este posea la formación y la competencia requeridas, para saber cómo evitar estas complicaciones o cómo tratarlas correctamente en el caso que sean inevitables.

La idea de este escrito es aportarle un complemento a la primera consulta. Le aconsejamos conservarlo y releerlo después de la misma. Seguramente surgirán nuevos interrogantes y dudas para las cuáles estaremos a su entera disposición.